

# **PŘÍBALOVÁ INFORMACE**

## **FOSFOVET forte inj. ad us. Vet.**

### **1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:  
PHARMAGAL, s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

### **2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**FOSFOVET forte 100 mg/ml injekční roztok**

Acidum nucleicum

### **3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

1 ml přípravku obsahuje:

**Léčivá látka:**

Acidum nucleicum (ut natrii nucleinas) 100,0 mg  
(odpovídá 10 mg organicky vázaného fosforu)

**Pomocné látky:** Methylparaben 1,0 mg.

### **4. INDIKACE**

Jako roborans a tonikum:

- ošetření všeobecných poruch látkové výměny
- stavy slabosti a vyčerpanosti po překonané chorobě a těžkých porodech
- snížená životaschopnost ulehnutých zvířat
- slabá pohlavní činnost
- podpora léčby při terapii sterility
- kareční výživa v jarních měsících v souvislosti s nevhodnými krmnými podmínkami

Poruchy vývoje a tvorby kostí:

- rachitis a osteomalace
- podpora špatně se hojících zlomenin kostí (callus) ve spojení s léčbou vitamínem D
- tetanie, parézy v souvislosti s narušením poměru Ca, Mg, P ve spojení s léčbou vápníkem a hořčíkem

### **5. KONTRAINDIKACE**

Nejsou známé.

### **6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Nejsou známé.

### **7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Skot, prasata.

## **8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ**

### **Podávané množství:**

Pro nárazovou léčbu: relativně vysoké dávky od 10 ml do 50 ml (podle druhu a velikosti zvířat) s.c. nebo i.m. rozděleně na více míst. Dle potřeby aplikaci po 1 – 2 dnech opakovat až do výrazného zlepšení onemocnění. U chronických onemocnění se nejlépe osvědčuje kúra po 2 – 5 ml s.c. injekcích.

Každý druhý den se podává injekce v dávce:

telata 5 – 10 ml pro toto, skot 10 – 15 ml pro toto, selata 0,5 – 1,5 ml pro toto,

prasata 1,5 – 3 ml pro toto, vždy podle velikosti a stavu zvířat.

### **Způsob podání:**

Intramuskulárně, subkutánně.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

## **9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Relativně vysoké dávky od 10 ml do 50 ml (podle druhu a velikosti zvířat) se doporučuje aplikovat s.c. nebo i.m. rozděleně na více míst.

## **10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Bez ochranných lhůt.

## **11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v suchu. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 5 dnů.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávat mimo dosah dětí.

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Přípravek se může používat během březosti a laktace.

Pokud dojde k zasažení kůže, sliznic nebo očí, vypláchněte zasažená místa velkým množstvím vody. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití přípravku si umyjte ruce.

## **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

## **14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Říjen 2019

## **15. DALŠÍ INFORMACE**

Pouze pro zvířata.

Pouze na předpis veterinárního lékaře.