

Příbalová informace

Název přípravku:	ŽIVÝ NÁPOJ - PG prášek pro přípravu perorálního roztoku Veterinární rehydratační přípravek
Výrobce a držitel rozhodnutí:	PHARMAGAL, s. r. o., Murgašova 5, 94901 Nitra, Slovenská republika.
Složení:	Sodium citrate 3,93 g Sodium acetate 3,39 g Sodium propionate 1,92 g Potassium chloride 3,00 g Sodium chloride 4,70 g Potassium dihydrogen phosphate 1,36 g Silicon dioxide colloidal anhydrous, Sunset yellow E 110, Glucose ad 85,00 g
Popis vet. přípravku:	Prášek pro přípravu perorálního roztoku Červeno-růžový jemně zrnitý prášek.
Druh a kategorie zvířat:	Telata
Charakteristika:	Progresivní způsob rehydratace telat postižených průjmem vyvolaným nutričními, bakteriálními, virusovými anebo kryptosporidiovými vlivy. Efektivní prostředek ke zvýšení zdrojů energie a elektrolytů.
Oblast užití:	<ul style="list-style-type: none">• Včasná pomoc při prvních příznacích onemocnění spojených s průjmem.• Rychlá rehydratace telat postižených průjmem.• Kontrola dehydratace spojené s průjmem u telat, včetně odstavených telat.• Aditivum při dehydrataci po intravenózní rehydratační terapii.• Acidóza spojená s průjmy.• Ideální zdroj glukózy a elektrolytů po příchodu nově odstavených nebo silně stresovaných telat.
Způsob podání:	Veterinární přípravek je určen jen k perorálnímu podávání, rozpuštěný v pitné vodě nebo v mléčné náhražce. Nádoby na podávání se mají udržovat v čistotě.
Dávkování:	Jedno balení 85 g odpovídá jedné dávce. Při prvních příznacích průjmu vysaďte mléko nebo mléčnou náhražku a podávejte: První dva dny: obsah jednoho balení 85 g rozpustíte v 2 litrech teplé vody (cca 30-37 ° C) a podávejte 2x denně po dobu 2 dny (4 krmení). Následující 2 dny: obsah jednoho balení 85 g rozpustíte v 1 litru vody a tento roztok přípravku smíchejte s 1 litrem mléčné náhražky a podávejte 2x denně po dobu 2 dny (4 krmení). Přípravek se doporučuje podávat maximálně po dobu 4 dní. Po ukončení podávání veterinárního přípravku se doporučuje vrátit k běžnému režimu krmení. Připravený roztok je nutné spotřebovat do 24 hodin. Pokud je průjem úpornější nebo přetrvává a způsobuje vážnější dehydrataci, je vhodné podávat 2 litry roztoku veterinárního přípravku 3-4krát denně. Pokud nedochází k zlepšení zdravotního stavu nebo se zdravotní stav po 4

dnech zhorší, poradte se s veterinárním lékařem.

Ve vážnějších případech mohou některé telata vyžadovat současnou i.v. rehydratační terapii. V těchto případech se poradte s veterinárním lékařem.

Pomůcky pro krmení udržujte v čistotě a vyhýbejte se překrmování. Telata napájejte kvalitním mlezivem.

Poznámka:

Naředěný roztok je třeba chránit před přímým slunečním světlem a připravovat denně čerstvý.

Po rozpuštění obsahu balení se mohou objevit jemné usazeniny nerozpustných složek přípravku, které neovlivňují jeho účinnost.

Upozornění:

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti. Při práci s veterinárním přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při styku s kůží je třeba umýt pokožku vodou.

Způsob uchovávání:

Uchovávat při teplotě do 25°C, chránit před světlem. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Doba použitelnosti:

24 měsíců, po naředění v pitné vodě 24 hodin.

Velikost balení:

85 g, 850 g.

Označení:

Pouze pro zvířata.

Číslo schválení:

117-19/C

Upozornění na způsob
nakládání a zneškodnění
nepoužitého veterinárního
přípravku a obalu:

Všechn nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který
pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních
právních předpisů.

č. šarže:

EXP: